

Ziekte van Parkinson en het rijbewijs



Waarom zijn er normen bij de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. In specifieke gebieden van de hersenen sterven hersencellen af. Dat leidt tot functiebeperkingen van het bewegingsapparaat: stijfheid, trillen, houdingsafwijkingen enzovoort. Maar ook tot verminderd cognitief functioneren, tot aan Parkinsondementie toe.

Zowel de beperkingen in de bewegingen alsook de mentale gevolgen, zoals het moeilijk verdelen van de aandacht, kunnen een negatieve invloed hebben op het veilig besturen van een gemotoriseerd voertuig. Omdat de gevolgen voor iedere Parkinsonpatiënt anders zijn, bepaalt de prestatie op een individuele rijtest op de weg de uiteindelijke geschiktheid.

Wanneer ben ik rijgeschikt bij Parkinson?

Groep 1 rijbewijzen (auto en motorfiets)

Bij afwezigheid van voor de rijgeschiktheid relevante functiebeperkingen of als die er wel zijn, na een positief afgelegde rijtest met de deskundige van het CBR.

Groep 2 rijbewijzen (vrachtwagen en bus)

Alleen als er geen voor de rijgeschiktheid relevante functiebeperkingen zijn (heel lichte Parkinson) kunt u geschikt zijn voor groep 2.

Wie levert het CBR de informatie?

Voor de beoordeling van de rijgeschiktheid is altijd een rapport nodig van een neuroloog.

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?

Groep 1 rijbewijzen (auto en motorfiets)

De maximale geschiktheidstermijn is vijf jaar.

Groep 2 rijbewijzen (vrachtwagen en bus)

De maximale geschiktheidstermijn is drie jaar.

Wanneer krijg ik een rijtest?

Alleen voor groep 1 rijbewijzen (auto) en als er een vermoeden is op voor de rijgeschiktheid relevante functiestoornissen. Gelukkig zijn die vaak door middel van aanpassingen aan de auto te compenseren en kunt u blijven autorijden.

Voor groep 2 is geen rijtest mogelijk.

Mag mijn eigen neuroloog het rapport opmaken?

Ja dat mag, als die dat wil.

Hoe zit dat met medicijnen?

Bij sommige medicijnen, pramipexol, rotigotine en ropinirol, komen plotselinge slaapaanvallen voor. Dat is natuurlijk gevaarlijk achter het stuur.

In de bijsluiter kunt u lezen dat u af moet zien van autorijden zodra de slaapaanvallen optreden. Neem contact op met uw neuroloog om de dosering mogelijk aan te passen. Besturen mag weer als de slaapaanvallen zijn verdwenen.